



Zalecenia produkcyjne – ziemniak wczesny

- Odmiana bardzo wczesna
- Przydatna do podkiełkowania i uprawy pod osłonami
- Duże bulwy
- Atrakcyjna lśniąca skórka
- Regularny rozmiar i kształt bulw



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	77 Bardzo wczesna
Okres spoczynku	56 Średni
Plon	99 Wysoki
Wielkość bulw	86 Bardzo duże
Kształt bulw	Owalne
Liczba bulw	9-11
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu po gotowaniu	Żółty
Typ kulinarny	AB-Lekko zwięzła
Sucha masa/Skrobia	17% / 11,2%
UWW/Ciężar właściwy	304 / 1,064
Uszkodzenia wewnętrzne	10 Lekko wrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	65 Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

Plon handlowy: 30-75 mm. kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin 75 cm
28/35	75.000	18
35/50	54.000	25
50/60	42.000	32

Głębokość sadzenia: 3 cm głębiej niż normalnie. Pomiędzy bulwą a wierzchołkiem redliny powinno być +/-18cm
W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	50	●●●●●●●●
Zaraza bulw	68	●●●●●●●●
Alternarioza	59	●●●●●●●●
Parch zwykły	60	●●●●●●●●
Parch prószysty	59	●●●●●●●●
Plamistość miąższu	70	●●●●●●●●
PVY	13	●●●●●●●●
Tolerancja na Yntn	98	●●●●●●●●

Odporność na PCN

Ro1/4 9	●●●●●●●●
Ro2/3 *8	●●●●●●●●
Pa2	●●●●●●●●
Pa3	●●●●●●●●

Rak ziemniaka

F1	*1	●●●●●●●●
F2	*1	●●●●●●●●
F6		●●●●●●●●
F18	*1	●●●●●●●●


* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Należy dostosować nawożenie do analiz gleby.
- Azot (N): ok.140kg (łącznie z Nmin)
- CARRERA jest wrażliwa na niedobór mikroelementów.
- Mangan i magnez mają wpływ na budowę silnej naci i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu.
- Na lekkich glebach zaleca się zastosowanie zwiększonej dawki boru.



Ogólne porady dotyczące uprawy



Przygotowanie sadzoniaków i sadzenie

- CARRERA ma średni okres spoczynku.
- Zaleca się obłamywanie kielka dominującego celem wytworzenia większej ilości pędów.
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy.
- Stosowanie środków zawierających azoxystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed chorobami grzybowymi roślin.
- Należy zadbać o dobrą strukturę gleby przed sadzeniem.
- CARRERA wysoko wiąże bulwy dlatego należy zadbać o bardzo dobre formowanie redlin aby zapobiec zielenieniu ziemniaków.



Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Rozwój liści na początku jest dosyć powolny. Należy zadbać o solidną dawkę azotu na początku wegetacji.
- Stosowanie metrybuzyny zalecane jest przed wschodami. Przy użyciu po wschodach, należy zmniejszyć dawkę. Warunki pogodowe mają silny wpływ na działanie metrybuzyny. Dostosuj dawkę do okoliczności.
- Należy zastosować solidną ochronę przed zarazą liści i bulw oraz przed alternariozą.
- Nawadnianie zapewnia regularny wzrost oraz minimalizuje występowanie pęknięć bulw



Niszczenie naci ziemniaczanej i zbiór

- CARRERA ma wczesną dojrzałość, a stolony odchodzą łatwo od bulw.
- Zbiór należy wykonywać ostrożnie, aby unikać obić i sinienia bulw.



Przechowywanie

- CARRERA jest odmianą bardzo wczesną i zaleca się szybką sprzedaż bezpośrednią.
- Po zbiorach należy szybko osuszyć ziemniaki.
- Należy zredukować temperaturę o 0,5 - 0,7°C na dzień, aż do uzyskania stabilnej temperatury, nie niższej niż 5-6°C
- Wentylować należy regularnie ale krótko, żeby zapobiec akumulacji CO₂.
- Wszelkie wahania temperatury połączone z kondensacją, zwiększają ryzyko kiełkowania oraz wystąpienia parcha srebrzystego.